

เกณฑ์การประเมินการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation) ๒๕๖๗

ประชุม ๘/๑๑/๒๕๖๖

๑. ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ๒๐ อันดับแรก (เอกสารแนบ ๑)

๒. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในโรค URI , Diarrhoea, แผล (ตามเกณฑ์คุณภาพของสปสช. ๑บาท/หัวประชากร)

๓.การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในผู้ป่วยในในยา ๓ รายการที่ต้องปรับขนาดในผู้ป่วยไต ได้แก่ Ceftazidime inj, Amoxicillin+clavuronic inj และ Gentamicin inj

๔.การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ในผู้ป่วยนอกในยาดังนี้ที่ต้องปรับขนาดในผู้ป่วยไต ได้แก่

- Bactrim tab,Ciprofloxacin, Augmantin,Acyclovir

-Lamivudine, TDF

-Metformin,Enalapril,Atenolol

-Allopurinol

-Oseltamivir, Favipiravir

๓. ยาบัญชี ๖

ตามรายการดังนี้ AZITHROMYCIN TAB, CLOPIDOGREL TAB, CIPROFLOXACIN TAB, PIOGLITAZONE TAB, FLUTICASONE NASAL SPRAY,